Fluconazol

Marca comercial: **Diflucan**
Clase de medicamento: **Infecciones oportunistas y otros**

El fluconazol, conocido también como Diflucan, pertenece a la clase de medicamentos llamados antimicóticos. Estos productos se emplean para eliminar la infección por hongos o para evitar que se multiplique o se propague. Cuando la infección por hongos se presenta en pacientes con inmunodeficiencia, incluso en las personas infectadas por el VIH, tiende a ser más grave y se conoce como infección oportunista.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El fluconazol puede emplearse para prevenir y tratar ciertos tipos de micosis, especialmente las ocurridas como infecciones oportunistas en pacientes inmunodeficientes infectados por el VIH.

Presentación/Administración

Se fabrica en tabletas, suspensión para administración oral y en forma líquida que por lo general se administra por infusión intravenosa. Esta última suele emplearse para tratar las micosis más graves.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informarle al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el fluconazol puede causar algunos efectos adversos. Entre ellos cabe citar fiebre y escalofrío; erupción cutánea o prurito; dolor de garganta; enrojecimiento, formación de ampollas, descamación o aflojamiento de la piel y de las membranas mucosas; orina de color oscuro o ámbar; inapetencia; deposiciones pálidas; dolor de estómago; cansancio o debilidad poco comunes; amarillamiento de los ojos o la piel; y hemorragia o hematomas poco comunes. Los pacientes deben informarle al médico si tienen síntomas de alguno de estos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Los efectos menos serios comprenden mareo, somnolencia, dolor de cabeza, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, náusea y vómito. Los pacientes deben informarle al médico si esos efectos adversos continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisarle al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian FLUCONAZOL, visite el sitio web de AIDSinfo: http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba FLUCONAZOL Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en http://www.clinicaltrials.gov para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Fluconazol AND HIV infections.

Fabricantes

Fluconazole
Pfizer Inc
235 East 42nd Street
New York, NY 10017-5755
(800) 438-1985

Diflucan
Pfizer Inc
235 East 42nd Street
New York, NY 10017-5755
(800) 438-1985

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

Fluconazol

Para más información (cont.)

• al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este

• al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este