

Rifabutin

Marca comercial: Mycobutin



La rifabutin, conocida también como Mycobutin, pertenece a la clase de medicamentos llamados antimicobacterianos. Estos productos previenen o combaten las infecciones causadas por cierto tipo de bacterias.

Formas de empleo

La rifabutin fue autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 23 de agosto de 1996 para uso junto con otros medicamentos para la prevención y el tratamiento de las enfermedades causadas por microorganismos del complejo *Mycobacterium avium* (CMA). También se emplea con otros productos para el tratamiento de la tuberculosis en pacientes infectados por el VIH tratados con ciertos antirretrovirales y en algunos pacientes no infectados. Este complejo y la tuberculosis son infecciones oportunistas que afectan comúnmente a los pacientes con infección por el VIH o SIDA.

Presentación/Administración

La rifabutin se fabrica en cápsulas y se toma una vez al día con comida o sola. Sin embargo, si causa malestar estomacal, los pacientes pueden tomar la mitad de la cápsula dos veces al día con comida.

Contraindicaciones

Las personas con cualquier afección previa deben informárselo al médico antes de tomar rifabutin.

Posibles efectos secundarios

Junto con sus efectos deseables, este producto puede causar algunos efectos adversos graves. Es preciso informar al médico si una persona tratada con este medicamento tiene alguno de los siguientes efectos secundarios: problemas de los ojos, incluso dolor, enrojecimiento o pérdida de la vista; picazón, enrojecimiento o erupción de la piel; problemas estomacales graves o prolongados, incluso diarrea, pirosis, inapetencia, náusea o vómito; y coloración amarillenta de los ojos o la piel.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre los efectos secundarios menos

graves de este medicamento cabe citar cefalea y dificultad para dormir. La rifabutin puede cambiar el color de la orina, la materia fecal, la saliva, el sudor, las lágrimas o la piel a un color naranja rojizo o marrón rojizo; si las lágrimas adquieren ese color, pueden manchar las lentes de contacto blandas.

Interacción con otros medicamentos

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos

Para información sobre ensayos clínicos que tiene que ver con Rifabutin, visite el sitio Web de ClinicalTrials.gov en: <http://www.clinicaltrials.gov>. En la casilla de búsqueda, escriba: Rifabutin AND HIV Infections.

Fabricantes

Rifabutin
Pharmacia Corporation
100 Route 206 North
Peapack, NJ 07977
(888) 768-5501

Mycobutin
Pharmacia Corporation
100 Route 206 North
Peapack, NJ 07977
(888) 768-5501

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este

Rifabutina



Para más información (cont.)

- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m.,
hora del este