

Azitromicina



Marca comercial: Zithromax

La azitromicina, conocida también como Zithromax, pertenece a la clase de medicamentos llamados antibacterianos o antibióticos. Estos productos eliminan las bacterias (microorganismos causantes de infección en el ser humano) o impiden su multiplicación.

Formas de empleo

Los pacientes inmunodeficientes, incluso las personas infectadas por el VIH, suelen tener infecciones bacterianas más frecuentes y graves. La azitromicina fue autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos el 14 de junio de 1996 para muchos usos, incluso para la prevención y el tratamiento de las infecciones causadas por el complejo de *Mycobacterium avium* (MAC) en personas en etapa avanzada de la infección por el VIH. También se investiga para determinar hasta qué punto previene otras clases de infecciones bacterianas en pacientes VIH-positivos.

Presentación/Administración

Se fabrica en cápsulas y en líquido de administración oral. Debe tomarse por lo menos 1 hora antes o 2 horas después de comer. Las tabletas pueden tomarse con comida. También se fabrica en solución para inyección intravenosa.

Contraindicaciones

Las personas con enfermedad del hígado o de los riñones deben informar al médico antes de tomar este medicamento. Este producto quizá no sea apropiado para el tratamiento de pacientes con neumonía.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, la azitromicina puede causar algunos efectos adversos graves. Es preciso suspenderla y avisar al médico de inmediato si un paciente presenta cualquiera de los síntomas siguientes después de recibir una inyección intravenosa de azitromicina: dolor, enrojecimiento e inflamación del sitio de la inyección.

En casos raros, la azitromicina ha causado reacciones graves. Los pacientes deben suspenderla y avisar al médico de inmediato si tienen cualquiera

de los siguientes síntomas de una reacción grave: dolor abdominal, diarrea (intensa, acuosa o sanguinolenta), fiebre, dolor de las articulaciones, cólico intenso o dolor de estómago intenso, erupción cutánea, inflamación de la cara, la boca, el cuello, las manos y los pies o dificultad respiratoria.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre los efectos secundarios menos graves están diarrea leve, náusea, dolor de estómago y vómito.

Interacción con otros medicamentos

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas), especialmente si se trata de antiácidos que contienen aluminio o magnesio.

Ensayos clínicos

Para información sobre ensayos clínicos que tiene que ver con Azitromicina, visite el sitio Web de ClinicalTrials.gov en: <http://www.clinicaltrials.gov>. En la casilla de búsqueda, escriba: Azitromicina AND HIV Infections.

Fabricantes

Azithromycin
Pfizer Inc
235 East 42nd Street
New York, NY 10017-5755
(800) 438-1985

Zithromax
Pfizer Inc
235 East 42nd Street
New York, NY 10017-5755
(800) 438-1985

Azitromicina



Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este