

Valganciclovir



Marca comercial: Valcyte

El valganciclovir, conocido también como Valcyte, pertenece a la clase de medicamentos llamados antivíricos. Estos productos eliminan los virus o les impiden multiplicarse.

Formas de empleo

El valganciclovir fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 29 de marzo de 2001 para el tratamiento de los síntomas de retinitis por citomegalovirus (CMV) (una infección ocular) en pacientes con inmunodeficiencia, incluso en personas con infección por el VIH y SIDA. No cura la retinitis por CMV, pero puede evitar que empeoren los síntomas. En la actualidad se realizan estudios para determinar si el valganciclovir es inocuo y eficaz para prevenir los casos avanzados de la enfermedad causada por CMV en pacientes infectados por el VIH y para el tratamiento de la infección causada por CMV en bebés cuya madre es seropositiva. Fue autorizado por la FDA el 12 de septiembre de 2003 para prevenir la enfermedad causada por CMV en ciertos pacientes sometidos a trasplante de órganos.

Presentación/Administración

Se fabrica en tabletas y debe tomarse con comida.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Junto con sus efectos deseables, el valganciclovir puede causar algunos efectos adversos graves. Entre los efectos secundarios graves causados por este medicamento cabe citar deposiciones negras o con apariencia de alquitrán; sangre en la orina o la materia fecal, escalofrío, tos, fiebre, ronquera, lumbago o dolor lateral de la espalda, dolor o dificultad para orinar, palidez de la piel, visión con luz intermitente o destellos, moscas volantes o un velo que nubla parcialmente la vista, dolor de garganta, úlceras o puntos blancos en la boca, pequeños puntos rojos en la piel, dificultad respiratoria, hemorragia o formación de hematomas y cansancio o debilidad poco comunes. Los

pacientes deben informar al médico si tienen cualquiera de estos síntomas.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre los efectos secundarios menos graves cabe citar dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito, dolor de cabeza, adormecimiento u hormigueo de las manos o los pies e insomnio. Los pacientes deben informar al médico si estos efectos continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos

Para información sobre ensayos clínicos que tiene que ver con Valganciclovir, visite el sitio Web de ClinicalTrials.gov en: <http://www.clinicaltrials.gov>. En la casilla de búsqueda, escriba: Valganciclovir AND HIV Infections.

Fabricantes

Valganciclovir hydrochloride
Roche Laboratories
340 Kingsland Street
Nutley, NJ 07110
(973) 235-5000

Valcyte
Roche Laboratories
340 Kingsland Street
Nutley, NJ 07110
(973) 235-5000

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

Valganciclovir



Para más información (cont.)

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este