

Sulfametoxazol - Trimetoprima



Marca comercial: Septra, Bactrim

El sulfametoxazol-trimetoprima, conocido también como Bactrim, Septra o TMP-SMX, pertenece a la clase de medicamentos llamados antibacterianos y antiprotozoarios. Los antibacterianos destruyen las bacterias o les impiden multiplicarse. Los antiprotozoarios ayudan al cuerpo a controlar las infecciones causadas por protozoarios, microorganismos microscópicos que pueden causar enfermedad. Cuando ocurren infecciones bacterianas y protozoarias en pacientes con inmunodeficiencia, incluso en personas con la infección por el VIH o SIDA, suelen ser más graves y se llaman infecciones oportunistas.

Formas de empleo

El sulfametoxazol-trimetoprima fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos el 23 de junio de 1981 para uso en el tratamiento y la profilaxis de la neumonía por *Pneumocystis carinii*, una infección oportunista común en las personas infectadas por el VIH.

Presentación/Administración

El sulfametoxazol-trimetoprima se fabrica en suspensión y tabletas para administración oral y en forma inyectable. La suspensión y las tabletas deben tomarse con un vaso de agua y es preciso agitar bien la suspensión oral antes del uso.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Junto con sus efectos deseables, este producto puede causar algunos efectos adversos. Entre los efectos secundarios graves de este medicamento cabe citar picazón; erupción cutánea; dolor de las articulaciones y los músculos; dificultad para deglutir; palidez de la piel; enrojecimiento; formación de ampollas, descamación o desprendimiento de la piel; fiebre y dolor de garganta; hemorragia o hematomas poco comunes; cansancio o debilidad poco comunes; amarillamiento de los ojos o la piel; o aumento de la sensibilidad de la piel a la luz solar. Los pacientes deben informar al médico si tienen algunos síntomas de cualquiera de esos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y

disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre los efectos menos graves cabe citar diarrea, mareo, dolor de cabeza, inapetencia, aftas o inflamación de la lengua, náusea o vómito y cansancio. Los pacientes deben informar al médico si esos efectos secundarios continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos

Para información sobre ensayos clínicos que tiene que ver con Sulfametoxazol - Trimetoprima, visite el sitio Web de ClinicalTrials.gov en: <http://www.clinicaltrials.gov>. En la casilla de búsqueda, escriba: Sulfametoxazol - Trimetoprima AND HIV Infections.

Fabricantes

Sulfamethoxazole-Trimethoprim
King Pharmaceuticals, Inc.
501 Fifth Street
Bristol, TN 37620
(888) 840-5370

Septra
King Pharmaceuticals, Inc.
501 Fifth Street
Bristol, TN 37620
(888) 840-5370

Sulfametoxazol - Trimetoprima



Fabricantes (cont.)

Sulfatrim

Alpharma, Inc.
One Executive Drive
Fort Lee, NJ 07024
(201) 947-7774

Bactrim

Women First Healthcare
5355 Mira Sorrento Place - Suite 700
San Diego, CA 92121
(858) 509-1171

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este